

INTISARI

Anak yang sakit yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit akan menghadapi berbagai macam stressor. Stressor- stressor tersebut diantaranya perpisahan, kehilangan fungsi dan kontrol, ketakutan, perubahan gambaran diri dan nyeri. Stressor- stressor tersebut akan menimbulkan reaksi anak yang termanifestasi dalam bentuk kecemasan.. Stressor- stressor tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingkat perkembangan umur anak, pengalaman sakit, terdapatnya support system, mekanisme coping, diagnosa penyakit. Dukungan dari keluarga diperlukan sebagai suatu support system yang dapat digunakan oleh anak untuk menghadapi stressor – stressor tersebut, sehingga kecemasan dapat diminimalisir.

Adapun tujuannya untuk mengetahui tingkat kecemasan yang dialami anak selama proses hospitalisasi, tingkat dukungan keluarga selama proses hospitalisasi dan hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan pada anak usia sekolah yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Metode penelitian ini adalah penelitian non eksperimental yaitu penelitian korelasi dengan rancangan penelitian *cross sectional*. Tehnik pengambilan sampling dengan kuota sampling dan aksidental sampling.

Sebagian besar dukungan keluarga yang diberikan orangtua dikategorikan tinggi (63,33 %). Sedangkan kecemasan yang dialami oleh anak usia sekolah yang sedang menjalani perawatan di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil korelasi antara variabel dukungan keluarga dengan variabel kecemasan didapatkan hasil $\rho = -0,651$ dengan tingkat kemaknaan $p = 0,004$. Sehingga terdapat hubungan negatif dalam kategori tinggi antara dukungan keluarga dengan kecemasan.

Ada hubungan bermakna antara dukungan keluarga dengan kecemasan pada anak usia sekolah yang sedang di rawat di Bangsal Ibnu Sina RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Kata kunci : dukungan keluarga, kecemasan, anak usia sekolah

ABSTRACT

To treat the child whose sick in the hospital. They will deal with various stressor sorts. The stressors among other things are the separation, lost the function and the control, the fear, and pain. The stressors will provoke the reaction of the child that make the form of the anxiety. The stressors was influenced by many factors including being the young children, the experience was sick, the support system, the mechanism of coping, the illness diagnosis. The support from the family was needed as some support system that could be used by the child to deal the stressors, so as the anxiety could be minimized.

Knew the level of the anxiety that was experienced by the child, the level of the family's support for the process of the hospitalization, and relations of the family's support with the anxiety to the young children

The study method is non experimental survey that is the correlation survey with the survey cross sectional plan. Technically the sampling collection with quota sampling and accidental sampling method.

Most of the family support that were given by parents high categorized (63,33 %). Results of the correlation between the variable of the family's support with the variable of anxiety was obtained by results $\rho = -0,651$ and $p = 0,004$.

So. as to be gotten by negative relations in the high category between the family's support and the anxiety.

Had significant relations between the family's support and the anxiety to the young children that is treated in Ward of Ibnu Sina RSU PKU Muhammadiyah at Yogyakarta.

The low worder the family's support the anxiety the higher the anxiety