

INTISARI

Infark Miokard Akut (IMA) masih digolongkan sebagai salah satu problem kesehatan di dunia. Termasuk juga di Indonesia, dari data survei rumah tangga, angka kematian akibat IMA menempati urutan ketiga.

Faktor resiko IMA terdiri dari faktor resiko primer dan sekunder. Yang termasuk faktor resiko primer yaitu hiperlipidemia, merokok, hipertensi. Sedangkan faktor resiko sekunder terdiri dari diabetes mellitus (DM), obesitas, stres, kurang olah raga, alkohol, dan riwayat keluarga.

Prevalensi penderita IMA yang dirawat di ICCU RSUP Dr. Sardjito terdiri dari 44 (73,33%) laki-laki dan 16 (26,67%) perempuan. Umur yang terbanyak dari penderita adalah kelompok umur 61-70 sebanyak 21 (35%). Penderita yang disertai DM sebanyak 13 (21,67%), dan yang tidak disertai DM sebanyak 47 (78,33%) sedangkan penderita dengan faktor resiko hipertensi sebanyak 23 (38,33%). Hiperkolesterolemia terdapat pada 27 (45%) penderita dan Hipertrigliseridemia 6 (10%) penderita. Pada 13 (26%) penderita IMA terdapat Hipo-HDL-emia dan Hiper-LDL-emia terdapat pada 12 (24%) penderita.

Kata Kunci: IMA, faktor resiko primer, faktor resiko sekunder, prevalensi