

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prevalensi infeksi oleh *Staphylococcus* sp lebih besar dibandingkan infeksi oleh *Streptococcus* sp pada wanita yang menderita keputihan.
2. Penderita keputihan pada kelompok umur (35-40) tahun lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur (51-55) tahun.
3. Prosentase terbesar penderita keputihan adalah pada kelompok dengan aktivitas seksual (<3x/minggu), sedangkan prosentase terkecil pada kelompok dengan aktivitas seksual (3-7x/minggu).
4. Pada kelompok yang tidak memakai pembersih vagina lebih banyak menderita keputihan dibandingkan dengan kelompok yang memakai pembersih vagina.
5. Pada wanita yang menggunakan alat kontrasepsi jenis IUD lebih banyak menderita keputihan.

5.2. SARAN

Setelah melihat hasil penelitian ini, penulis menyarankan pada semua pembaca:

2. Perlu dilakukan penelitian serupa dengan menggunakan jumlah sample yang lebih banyak.
3. Perlu di lanjutkan penelitian sampai diketahui spesies *Staphylococcus* dan