

## Intisari

Angka kematian perinatal pada kasus presentasi bokong masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari ibu hamil untuk melakukan perawatan selama kehamilan dan juga penanganan persalinan yang kurang sesuai oleh tenaga medis. Hasil penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat bagi usaha peningkatan hasil penanganan persalinan presentasi bokong sehingga akan menurunkan angka kematian perinatal.

Usaha untuk menurunkan angka kematian perinatal pada kasus presentasi bokong dapat dimulai selama kehamilan, dalam persalinan, maupun setelah persalinan. Selama kehamilan dilakukan perawatan antenatal dan bila dijumpai kelainan presentasi (Presentasi bokong) diusahakan untuk dilakukan versi luar. Dalam persalinan, pertolongan persalinan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu persalinan pervaginam dan persalinan perabdominal (Seksio Sesarea). Pertolongan persalinan pervaginam dapat dilakukan dengan cara Bracht, ekstraksi parsial, maupun ekstraksi total. Setalah masa persalinan, dilakukan resusitasi pada bayi untuk memperbaiki serta menjaga kondisi bayi dengan memperbaiki sistem pernafasan dan pemeliharaan suhu tubuh.

Karena banyaknya komplikasi yang sering terjadi, maka diperlukan tenaga medis yang termotivasi dan berpengalaman serta fasilitas komunitas yang adil dan

## **ABSTRACT**

The death rate of perinatal in breech presentation cases is still high enough. It is caused by the lack of awareness of pregnant mother to take care of her pregnancy and unappropriate delivery handling by the medics as well. This article is expected to be useful for the efforts of raising delivery handling of breech presentation result in order to decrease the death rate of perinatal.

The efforts to decrease the death rate of perinatal in breech presentation case can be started either during the pregnancy, during delivery or after delivery. Antenatal treatment is done during the pregnancy and if there is malpresentation (breech presentation) it should be tried to have version in delivery, there are two methods of delivery aid ie vaginally and abdominally delivery (cesaria section). Vaginally method can be done both in Branch's method, Partial extraction or total extraction. After delivery, resuscitation to the body is done to improve and keep the body's condition by reforming the system of respiration and the temperature maintenance.

Many complications often happen, skilled and experienced medics and adequate resuscitation facilities in the delivery room for giving a birth is success.