

INTISARI

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perbedaan pola peningkatan tekanan darah selama trimester II dan III pada primigravida dibandingkan dengan multigravida dan prevalensi terjadinya hipertensi pada primigravida dan multigravida. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran pola peningkatan tekanan darah trimester II dan III pada primigravida dibandingkan dengan multigravida di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

Penelitian dilakukan di RSUP Dr. Sardjito dengan mengambil data dari rekam medik pasien yang melakukan kunjungan ANC selama trimester II dan III di bagian Obstetri dan Ginekologi dalam interval waktu 1 Juli - 31 Desember 1998. Data yang diambil meliputi tekanan darah ibu hamil, status kehamilan (primigravida dan multigravida), usia kehamilan, usia ibu, berat dan tinggi badan ibu serta keadaan edema, proteinuri dan gemelli selama trimester II dan III.

Berdasarkan hasil penelitian tidak ada perbedaan pola peningkatan tekanan darah pada primigravida jika dibandingkan dengan multigravida. Tetapi jumlah kejadian hipertensi terdapat perbedaan, dimana pada primigravida didapati kejadian hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan pada multigravida selama trimester II dan III. Prevalensi kejadian hipertensi pada primigravida sebesar 3,24% dan 1,83% pada multigravida.