

**Nur Aulia Rahma (2016)** Hubungan Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Tingkat Kecemasan Orang Tua pada Anak yang mengalami Hospitalisasi

**Pembimbing :** Wulan Noviani, S. Kep., Ns., MM

## **INTISARI**

**Latar Belakang :** Komunikasi terapeutik perawat merupakan suatu komunikasi dalam memberikan tindakan keperawatan yang bertujuan untuk kesembuhan pasien. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan komunikasi terapeutik salah satunya untuk mengurangi kecemasan orang tua terhadap hospitalisasi anak. Dampak dari kecemasan orang tua akan mempengaruhi pikiran dan motivasi sehingga akan mempengaruhi pemulihan dan kesembuhan anak. Kecemasan dipengaruhi oleh banyak hal dan salah satunya adalah komunikasi terapeutik. Sehingga diperlukan penelitian untuk menentukan hubungan antara komunikasi terapeutik dengan tingkat kecemasan orang tua.

**Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kecemasan orang tua pada hospitalisasi anak.

**Metode penelitian :** Penelitian ini bersifat korelasional dengan rancangan *cross sectional*. Sampel sebanyak 44 responden yang merupakan orang tua dengan anak berusia 0-17 tahun yang baru pertama kali mengalami hospitalisasi di bangsal Anggrek RSUD Panembahan Senopati Bantul dengan teknik *purposive sampling*. Analisis hipotesis korelasi menggunakan Uji *Spearman Rank*. Instrumen tingkat kecemasan memodifikasi dari *Zung Self-Rating Anxiety Scale* dan instrumen komunikasi terapeutik memodifikasi dari kuesioner Anggraeni.

**Hasil Penelitian :** Komunikasi terapeutik perawat sebagian besar baik yaitu 28 responden (63,6%). Tingkat kecemasan orang tua dengan anak yang mengalami hospitalisasi sebagian besar normal yaitu 13 responden (29,5%). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kecemasan orang tua pada anak yang mengalami hospitalisasi dengan  $p=0,000 (<0,05)$ .

**Kesimpulan :** Terdapat hubungan yang bermakna antara komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kecemasan orang tua. Peneliti menyarankan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik perawat dengan orang tua dengan anak yang mengalami hospitalisasi.

Kata Kunci : Komunikasi Terapeutik, Kecemasan, Hospitalisasi Anak.

**Nur Aulia Rahma (2016) Correlation Between Implementation of Therapeutic Communication of Nurses with Anxiety Level of Parents whose Children undergo Hospitalization**

**Advisor :** Wulan Noviani, S. Kep., Ns., MM

## **ABSTRACT**

**Background:** Therapeutic communication of nurse is a communication in nursing care that aimed to heal patient. Nurses have an important role in giving therapeutic communication to reduce parent anxiety of children who had hospitalization. The impact of parent's anxiety will affect the mind, motivation, and also affect process recovery and healing of children. Anxiety influenced by many factors and one of them is therapeutic communication. So, the research is needed to determine correlation between therapeutic communications with the anxiety level of parents

**Purpose:** This research aimed to know correlation between therapeutic communications of nurse with the parent anxiety of children who had hospitalization.

**Methods:** This research was correlation with cross sectional design the sample of this research was 44 respondents who were parents with children in age 0-17 which was first experience of hospitalization in ward Anggrek Panembahan Senopati Bantul Hospital with purposive technique of sampling. The analysis of hypothesis used spearman rank correlation. The instrument level of anxiety was modified based on Zung Self Rating Anxiety Scale and instrument of therapeutic communication was modified based on Anggraeni's questionnaire

**Result:** Therapeutic communication nurse mostly good in 28 respondents (63,6%). The parents anxiety of children who had hospitalization mostly normal in 13 respondents (29,5%). The result showed there was significant correlation between therapeutic communication nurse with parent anxiety of children who had hospitalization  $p=0,000 (<0,05)$ .

**Conclusion:** There was significant correlation between therapeutic communications of nurse with anxiety level of parents. Researchers suggest analyzing the factors that influence therapeutic communication of nurses with parents whose children undergo hospitalization.

**Keywords:** Therapeutic Communication, Anxiety, Child Hospitalization.