

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Hipotesis peneliti tidak terbukti. Tingkat keberhasilan terapi akupunktur dalam penatalaksanaan *low back pain* tidak lebih tinggi dari fisioterapi, namun setara.
2. Dari hasil probabilitas uji *Chi-Square*, nilai *Asymp. Sig. (asymptotic significance) 2 sided* yang didapat adalah 1,000 atau probabilitas di atas 0,05 yang bermakna bahwa  $H_0$  diterima.
3. Dari perolehan data primer dan sekunder baik akupunktur maupun fisioterapi, meraih angka yang sama yaitu sebanyak 29 pasien (96,7%) menyatakan bahwa nyeri tidak lagi dirasakan setelah terapi dihentikan.
4. Dan masing-masing dari tiap kelompok terdapat 1 orang (3,3%) yang menyatakan bahwa sebelum dan sesudah terapi dilakukan, nyeri yang dirasakan tidak ada perubahan yang berarti (tetap).

#### B. Saran

1. Perlu dilakukan perbaikan pada pertanyaan kuesioner sehingga dapat lebih

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah subyek penelitian yang lebih banyak jumlahnya supaya data yang didapat akan lebih akurat.
3. Perlu dilakukan penelitian yang mengacu pada perbedaan jenis kelamin