

## INTISARI

Tonsilitis kronik adalah salah satu penyakit yang paling sering ditemukan dalam bidang THT, dan merupakan suatu bentuk lanjut dari tonsilitis akut yang tidak mendapat terapi adekuat. Penatalaksanaan tonsilitis kronis terdiri atas penatalaksanaan konservatif yaitu dengan pemberian obat-obatan atau penatalaksanaan dengan pembedahan. Sampai saat ini masih terdapat pertentangan pendapat antara dokter anak dan dokter THT dalam memilih pengobatan yang paling tepat untuk tonsilitis kronik pada anak.

Dokter anak lebih memilih pengobatan konservatif mengingat fungsi penting tonsil sebagai organ limfoid sedangkan dokter THT pembedahan merupakan pengobatan yang lebih tepat karena tonsilitis kronik dapat berperan sebagai fokus infeksi berbagai penyakit, seperti reumatik dan penyakit kulit, glomerulonefritis, miokarditis dan *sleep apneu*.

Setelah mempelajari dari berbagai literatur yang ada mengenai kekurangan dan keuntungan dari tiap alternatif pengobatan dapat diambil kesimpulan bahwa langkah pertama pengobatan tonsilitis kronik adalah konservatif, yaitu dengan pemberian antibiotik yang tepat dan jika upaya tersebut mengalami kegagalan maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pembedahan.

## ABSTRACT

Chronic tonsillitis is one of the most frequently found in otolaryngologic diseases, and is a continuation process of acute tonsillitis which was failed to be treated in. There are two alternative treatments of chronic tonsillitis i.e. conservative medicamentous or surgery. Up to the present time there is still a controversial opinion between the pediatrician and otolaryngologist about selecting the right choice of treatment suitable for each of the two alternative treatment.

The pediatrician insist to conservative treatment because of the important role of tonsil as an immunologic producing organ, and the otolaryngologist insist to surgical treatment because chronic tonsillitis can act as a focal infection for rheumatic and skin disease, glomerulonephritis, myocarditis and sleep apnoe.

After analyzing thoroughly based on literatur review about the useful and harmful of each alternative treatment it is concluded that the first step of treatment of chronic tonsillitis is conservative, using the right choice of antibiotic, if it is fail