

INTISARI

Insidensi pankreatitis akut sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu negara ke negara yang lain. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena alkohol, batu empedu, faktor-faktor metabolik dan obat-obatan. Misalnya di Amerika Serikat, pankreatitis akut lebih sering berhubungan dengan pemakaian alkohol dan batu empedu; di Inggris keadaan adalah sebaliknya.

Patogenesis dari penyakit ini adalah terjadinya autodigesti yang merusak pankreas dan jaringan atau organ sekitarnya.

Diagnosis pankreatitis akut dapat ditegakkan bilamana pada pasien didapatkan nyeri perut yang hebat dan menetap, mual, muntah, demam, takikardi dan gejala-gejala abnormal yang lain. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan adanya leukositosis, kenaikan enzim pankreas seperti amilase dan lipase. Diagnosis juga bisa ditegakkan bila ada gambaran abnormal pada foto polos abdomen dan foto thoraks, dan juga dengan pemeriksaan radiologis seperti Ultrasonografi (USG) atau Computed Tomografi (CT).

Sedangkan penatalaksanaan pankreatitis akut didasarkan atas tingkatan berat dan ringannya penyakit.